

Số: 15 /TB-TTBVTV

Ninh Bình, ngày 07 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu đục thân lúa 2 chấm hại lúa Đông xuân năm 2018

Hiện nay trà lúa xuân sớm đang ở giai đoạn chắc xanh - chín, trà xuân muộn ôm đòng - trở bông. Qua kết quả điều tra tình hình diễn biến dịch hại trên đồng ruộng cho thấy một số đối tượng dịch hại đang phát sinh và có khả năng gây hại trên các trà lúa. Cụ thể:

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Lúa 2 đã gây hại rộng trên các trà lúa, hiện tại trên đồng ruộng mật độ rầy phổ biến: 90-100 con/m²; nơi cao: 300-400 con/m²; cá biệt: 500-700 con/m² T_{4-tt}. Trứng rầy lúa 3 xuất hiện rải rác, mật độ nơi cao: 200-300 quả/m² (Yên Mô, Yên Khánh, Kim Sơn...).

Trong thời gian tới, rầy cám lúa 3 sẽ nở rộ từ 18/5-25/5, gây hại cục bộ trên trà lúa xuân muộn ở giai đoạn trở bông đến chín sấp. Mật độ phổ biến: 200-300 con/m²; nơi cao: 700-1.000 con/m²; ổ trên 3.000 con/m². Nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời những diện tích có mật độ rầy cao sẽ gây cháy ổ từ cuối tháng 5 trở đi, ảnh hưởng đến năng suất lúa.

2. Sâu đục thân lúa 2 chấm: Hiện nay, bướm sâu đục thân lúa 2 chấm lúa 2 đang ra rộ, mật độ nơi cao: 0,1-0,5 con/m², trứng mật độ nơi cao: 0,05-0,3 ổ/m². Sâu non đang nở rộ và gây hại rải rác trên trà lúa xuân sớm, tỷ lệ hại nơi cao: 0,5-1% (Gia Viễn, Nho Quan).

Trong thời gian tới, bướm lúa 2 tiếp tục ra rộ đến 15/5, sâu non tiếp tục nở rộ đến 22/5 gây hại cục bộ trên trà lúa trở sau 10/5 ở các huyện phía bắc tỉnh và sau 15/5 ở các huyện phía nam tỉnh. Tỷ lệ hại nơi cao: 2-3%; cá biệt trên 10% số bông (Nho Quan, Hoa Lư, TP Tam Điệp, Gia Viễn...).

Ngoài ra, bệnh đạo ôn cổ bông hại tăng trên giống nhiễm; bệnh khô vằn hại rộng trên các trà lúa; bệnh bạc lá, nhện gié hại cục bộ, bệnh lùn sọc đen phương Nam hại rải rác.

Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây hại của rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu đục thân lúa 2 chấm. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. Đảm bảo đủ nước để cho lúa trở bông - làm hạt.

2. Phát động toàn dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân rõ các trà lúa, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng (Chú ý: rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân lúa 2 chấm, bệnh khô vằn, bệnh lùn sọc đen phương Nam... trên cây lúa). Cụ thể:

+ **Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng:** Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ kịp thời trên những ruộng có mật độ rầy ≥ 1500 con/m². Thời gian phun trừ từ ngày 22/5-27/5 bằng một trong các loại thuốc trừ rầy tiếp xúc như: Penaty gold 50EC, Victory 585EC, Bonus gold 40EC, Palano 600 WP, Niten Super 500 WP... (Chú ý: Ở giai đoạn này khi sử dụng các loại thuốc trừ rầy nhất thiết phải rẽ hàng để thuốc phun tiếp xúc trực tiếp với rầy và cần lựa chọn các loại thuốc để đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch).

+ **Đối với sâu đục thân lúa 2 chấu:** Tiến hành phun trừ trên những ruộng có mật độ ổ trứng $\geq 0,3$ ổ/m² khi sâu non tuổi 1 nở rộ, thời gian phun trừ từ ngày 10/5 trở đi đối với các huyện phía bắc tỉnh và từ 20/5 trở đi đối với các huyện phía nam tỉnh. Những ruộng có mật độ ổ trứng ≥ 1 ổ/m² phải phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Prevathon 5SC; Voliam targo 063 SC; Bonus gold 50 EC; Victory 585EC; Virtako 40WG, Tasodant 600EC...

+ **Đối với bệnh đạo ôn cổ bông:** Tiếp tục phun phòng theo tốc độ lúa trổ trên những ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá, ruộng xanh tốt, gần nguồn bệnh, giống nhiễm.

3. Các trạm BVTV huyện, thành phố căn cứ vào thông báo của Chi cục và tình hình cụ thể của huyện mình tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại gây ra./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (để b/c);
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT (để b/c);
- Phòng nghiệp vụ tổng hợp Sở NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm khuyến nông;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Phòng Nông nghiệp, Kinh tế các huyện, TP;
- Trạm TTBVTV các huyện, TP;
- Lưu VP.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Vũ Khắc Hiếu