

Số: **09** /TB-TTBVTV

Ninh Bình, ngày **26** tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ lúa 3, sâu đục thân hai chấm hại lúa Đông xuân năm 2019

Đến nay trà lúa xuân sớm đang ở giai đoạn đở đươi đến thu hoạch, trà xuân muộn đang ôm đòng đến chắc xanh. Nhìn chung trên phạm vi toàn tỉnh lúa sinh trưởng và phát triển tốt do đảm bảo đủ nước, chăm sóc và phòng trừ dịch hại kịp thời. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra tình hình diễn biến dịch hại trên đồng ruộng cho thấy một số đối tượng dịch hại đang phát sinh và có khả năng gây hại trên các trà lúa. Cụ thể:

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Lúa 2 đã gây hại rộng trên các trà lúa, hiện tại mật độ rầy trên đồng ruộng phổ biến: 100-120 con/m²; nơi cao: 300-500 con/m²; cá biệt ổ: 700-1000 con/m²T₃₋₅ (Yên Mô, Kim Sơn, Hoa Lư...).

Trong thời gian tới rầy cám lúa 3 sẽ nở rộ từ ngày 5/5-15/5, gây hại cục bộ trên trà lúa xuân muộn đang ở giai đoạn trỗ bông đến chín. Mật độ phổ biến: 300-500 con/m², nơi cao: 1.000-2.000 con/m², ổ trên 3.000 con/m² (Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh...). Nếu không phát hiện và phòng chống kịp thời, rầy sẽ gây cháy ổ sau 15/5 trở đi ảnh hưởng đến năng suất lúa, đồng thời là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen phương Nam trên đồng ruộng. Quy mô, mức độ hại cao hơn so với cùng lúa vụ Đông xuân năm 2018.

2. Sâu cuốn lá nhỏ: Bướm sâu cuốn lá nhỏ lúa 3 đang ra rộ và tiếp tục rộ đến 05/5, sâu non nở rộ từ: 28/4- 0/5, gây hại rộng trên trà lúa trỗ sau 5/5 ở các huyện phía nam tỉnh. Mật độ sâu phổ biến: 10-20 con/m², nơi cao: 30-50 con/m², cá biệt trên 100 con/m² (Kim Sơn, Yên Mô...). Nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời sẽ làm sọc, trắng lá đòng ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa. Quy mô, mức độ hại thấp hơn so với cùng lúa vụ Đông xuân năm 2018.

3. Sâu đục thân hai chấm: Bướm lúa 2 tiếp tục rộ đến 10/5, sâu non tiếp tục nở rộ đến ngày 17/5, gây hại trên trà lúa trỗ sau ngày 25/4 ở các huyện phía Bắc tỉnh và trỗ sau ngày 5/5 ở các huyện phía Nam tỉnh. Tỷ lệ hại nơi cao: 3-5%; cá biệt: 10-15% số bông (Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, TP Tam Điệp...). Quy mô, mức độ hại cao hơn so với cùng lúa vụ Đông xuân năm 2018.

Ngoài ra, bệnh đạo ôn cổ bông hại tăng trên giống nhiễm; bệnh khô vằn hại rộng trên các trà lúa; bệnh bạc lá, nhện gié hại cục bộ, bệnh lùn sọc đen phương Nam hại rải rác.

Đề hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây hại của rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân lúa hai chấm. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. Đảm bảo đủ nước để cho lúa trở bông - làm hạt.

2. Phát động toàn dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng (Chú ý: rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân lúa 2 chấm... trên cây lúa).

+ **Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng:** Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ kịp thời trên những ruộng có mật độ rầy ≥ 1.500 con/m². Thời gian phun trừ từ ngày 8/5-14/5 bằng một trong các loại thuốc trừ rầy tiếp xúc như: Victory 585EC, Bonus gold 40EC, Penaty gold 50EC, Palano 600 WP, Niten Super 500 WP, Bassa 40 EC... (Chú ý: Ở giai đoạn này khi sử dụng các loại thuốc trừ rầy nhất thiết phải rẽ hàng để thuốc phun tiếp xúc trực tiếp với rầy và cần lựa chọn các loại thuốc để đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch).

+ **Đối với sâu cuốn lá nhỏ:** Phun trừ trên những ruộng có mật độ sâu ≥ 20 con/m² khi sâu non tuổi 2 rộ. Thời gian phun trừ từ 2/5-8/5 bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Clever 150SC, 300WG; Directer 70EC; Virtako 40WG; Voliam Targo 063SC; Tango 800WG; Michigane 800WG; Silsau 4.5EC; Dylan 5WP... (Những ruộng có mật độ sâu cao ≥ 200 con/m² phải tiến hành phun trừ 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 4-5 ngày).

+ **Đối với sâu đục thân lúa 2 chấm:** Tiến hành phun trừ trên những ruộng có mật độ ổ trứng $\geq 0,3$ ổ/m² khi sâu non tuổi 1 nở rộ, thời gian phun trừ từ ngày 30/4 trở đi đối với các huyện phía Bắc tỉnh và từ 5/5 trở đi đối với các huyện phía Nam tỉnh. Những ruộng có mật độ ổ trứng ≥ 1 ổ/m² phải phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Prevaton 5SC; Voliam targo 063 SC; Bonus gold 50EC; Victory 585EC; Virtako 40WG...

Tiếp tục phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông theo Thông báo số 08/TB-TTBVTV ngày 10/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 hại lúa Đông Xuân năm 2019.

3. Các trạm TTBBVTV huyện, thành phố căn cứ vào thông báo của Chi cục và tình hình cụ thể của huyện mình tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại gây ra./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc (để b/c);
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT (để b/c);
- Phòng nghiệp vụ tổng hợp Sở NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm khuyến nông;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Phòng Nông nghiệp, Kinh tế các huyện, TP;
- Trạm TTBBVTV các huyện, TP;
- Lưu VP.



Vũ Khắc Hiếu