

Số: **23** /TB-TTBVTV

Ninh Bình, ngày **06** tháng 9 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 và sâu đục thân lúa 2 chấm hại lúa vụ mùa năm 2018

Đến nay trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn trỗ bông đến chắc xanh; trà lúa mùa trung, mùa muộn: cuối đẻ - làm đòng. Nhìn chung trên phạm vi toàn tỉnh lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra tình hình dịch hại trên đồng ruộng cho thấy một số đối tượng đang phát sinh và có khả năng gây hại rộng trên các trà lúa, cụ thể:

**1. Rầy nâu, rầy lưng trắng:** Lúa 6 đã gây hại rộng trên các trà lúa ở các huyện, thành phố trong tỉnh, hiện tại mật độ rầy trên đồng ruộng phổ biến từ: 100-120 con/m<sup>2</sup>, nơi cao: 300-500 con/m<sup>2</sup>; cá biệt trên 2000 con/m<sup>2</sup> T<sub>3-5-tt</sub> (Yên Mô, Hoa Lư, Kim Sơn, Yên Khánh...). Trứng rầy lúa 7 đang bắt đầu ra rộ, mật độ phổ biến: 100-200 quả/m<sup>2</sup> nơi cao: 5.00-1.000 quả/m<sup>2</sup> (Yên Mô, Yên Khánh...);

Trong thời gian tới, rầy cám lúa 7 sẽ nở rộ từ 13/9 đến 23/9, mật độ phổ biến: 300-400 con/m<sup>2</sup>; nơi cao: 2.000-3.000 con/m<sup>2</sup>; ỏ: hàng vạn con/m<sup>2</sup> gây hại cục bộ trên các trà lúa, nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời sẽ làm đổ lúa hoặc gây cháy ỏ từ sau 25/9 trở đi, đặc biệt trên trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn chín.

**2. Sâu cuốn lá nhỏ:** Bướm sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 đang ra rộ, mật độ phổ biến: 0,5 con/m<sup>2</sup>; nơi cao: 3-5 con/m<sup>2</sup>. Trứng mật độ phổ biến: 20-30 quả/con/m<sup>2</sup>, nơi cao: 50-80 quả/m<sup>2</sup>, sâu non đang bắt đầu nở rộ, mật độ nơi cao: 15-20 con/m<sup>2</sup> (Kim Sơn, Yên Khánh).

Trong thời gian tới bướm sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 sẽ tiếp tục ra rộ đến 15/9. Sâu non sẽ nở rộ từ 8/9 đến 21/9, gây hại rộng trên các trà lúa mùa trung đang ở giai đoạn phân hoá đòng đến ôm đòng. Nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời nhiều diện tích bị hại nặng sẽ làm sơ trắng bộ lá đòng ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa.

Ngoài ra bướm sâu đục thân lúa 2 chấm lúa 5 tiếp tục ra, sâu non tiếp tục nở rộ và gây hại trên các trà lúa trỗ từ nay đến cuối tháng 9 ở tất cả các huyện thành phố trong tỉnh; bệnh lùn sọc đen phương nam, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại tăng trên các trà lúa; bệnh đạo ôn cổ bông hại cục bộ trên các giống nhiễm như nếp, BC 15, TBR 225...

**Để đảm bảo sản xuất vụ mùa 2018 thắng lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:**

- Điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho lúa làm đòng, trổ bông.  
- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân rõ các trà lúa, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng. Cụ thể:

+ **Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 7:** Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện và phun trừ kịp thời khi rầy tuổi 2 rộ thời gian phun trừ từ 17-22/9. Trên trà mùa sớm những ruộng có mật độ rầy  $\geq 1.500$  con/m<sup>2</sup> phun trừ bằng một trong các thuốc tiếp xúc như: Penaty gol 50EC, Victory 585EC, Bonus gold 40EC, Bassa 50EC... Trên trà mùa trung, mùa muộn, những ruộng có mật độ rầy  $\geq 2000$  con/m<sup>2</sup> phun trừ bằng một trong các thuốc nội hấp như: Penatyl 40WP, Sutin 5 EC; 50 SC, Midan 10WP, Chersieu 50 WG, Chess 50 WG... (Chú ý: Khi sử dụng các loại thuốc trừ rầy tiếp xúc nhất thiết phải rẽ hàng để thuốc phun tiếp xúc trực tiếp với rầy, cần lựa chọn các loại thuốc để đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch).

+ **Đối với sâu cuốn lá nhỏ lúa 7:** Phun trừ trên những diện tích có mật độ sâu  $\geq 20$  con/m<sup>2</sup>; khi sâu non tuổi 2 rộ thời gian phun trừ từ ngày 13-18/9 bằng các loại thuốc có hoạt chất: Fipronil, Indoxacarb, Abamectin, Emamectin. Những ruộng có mật độ sâu cao  $\geq 200$  con/m<sup>2</sup> phải tiến hành phun trừ 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày.

+ **Đối với sâu đục thân lúa 2 chấm lúa 5:** Tiếp tục phòng trừ sâu đục thân lúa 2 chấm ở những ruộng mật độ ổ trứng  $\geq 0,3$  ổ/m<sup>2</sup> khi sâu non tuổi 1 rộ, thời gian phun trừ từ nay đến 20/9. Những ruộng có mật độ ổ trứng  $\geq 1$  ổ/m<sup>2</sup> phải phun kép 2 lần, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Prevathon 5SC; Voliam Targo 063SC, Tasodant 600EC; Bonus Gold 50EC; Victory 585EC; Virtako 40WG...

+ **Đối với bệnh lùn sọc đen phương Nam:** Tiếp tục phát hiện và nhổ vùi cây bệnh, khoanh vùng phun trừ rầy môi giới hạn chế tối đa sự lây lan của bệnh trên đồng ruộng.

Ngoài ra kết hợp phòng trừ bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống nhiễm.

Các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thành phố căn cứ vào thông báo của chi cục và tình hình cụ thể của huyện mình tham mưu cho UBND các huyện, thành phố; hướng dẫn, chỉ đạo các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại gây ra./.

**Nơi nhận:**

- Cục BVTV, TTBVTV phía Bắc (Đề b/c);
- Sở NN&PTNT (Đề b/c);
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nghiệp vụ tổng hợp – Sở NN&PTNT;
- Trung tâm khuyến nông;
- Phòng kinh tế, P. Nông nghiệp các huyện, thành phố;
- Trạm TT và BVTV các huyện, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Ninh Bình;
- Lưu VP.

**CHI CỤC TRƯỞNG**



**Vũ Khắc Hiếu**