

Số: 21 /TB-TTBVTV

Ninh Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Tình hình sâu đục thân lúa 2 chấm lúa 5; rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 hại lúa vụ mùa năm 2018

Đến nay trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn ôm đòng đến trỗ bông; trà lúa mùa trung, mùa muộn: đẻ nhánh đến cuối đẻ. Nhìn chung trên phạm vi toàn tỉnh lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, kết quả điều tra tình hình dịch hại trên đồng ruộng cho thấy một số đối tượng đang phát sinh và có khả năng gây hại rộng trên các trà lúa, cụ thể:

1. Sâu đục thân lúa 2 chấm: Lúa 4 gây hại rải rác trên các trà lúa, đặc biệt trên trà lúa mùa sớm, mật độ trung bình: 0,2 con/m² cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn so vụ mùa năm 2017 cùng lúa, nơi cao: 0,5-2 con/m², cá biệt: 5-7 con/m² T_{4-N} (Nho Quan, Yên Mô...).

Trong thời gian tới bướm sâu đục thân lúa hai chấm lúa 5 sẽ ra rộ từ 18/8-3/9, sâu non sẽ nở rộ từ ngày 25/8-10/9, gây hại rộng trên các trà lúa trỗ sau 25/8 ở các huyện phía Bắc tỉnh và sau 1/9 ở các huyện phía Nam tỉnh. Đặc biệt hại nặng trên diện tích lúa hiện nay đang giai đoạn cuối đẻ nhánh đến ôm đòng ở các huyện Nho Quan, Yên Mô, Gia Viễn... Tỷ lệ hại nơi cao: 5-10%; cá biệt trên 30% đòng héo, bông bạc. Nếu không phun trừ kịp thời những diện tích bị hại nặng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa, Quy mô mức độ gây hại cao hơn so với vụ mùa 2017.

2. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Lúa 5 gây hại cục bộ trên các trà lúa, mật độ rầy hiện tại phổ biến: 50-60 con/m², nơi cao: 100-300 con/m²; cá biệt ở trên 500 con/m² T₃₋₅. Tổng diện tích đã phòng trừ rầy lúa 5 (môi giới truyền bệnh lùn sọc đen) toàn tỉnh: 13.500 ha. Trứng rầy lúa 6 đang bắt đầu ra rộ, mật độ nơi cao: 300-500 quả/m², cá biệt ở 1.000-2.000 quả/m² (Yên Mô, Yên Khánh, Nho Quan...).

Trong thời gian tới rầy cám lúa 6 sẽ nở rộ từ 23/8-2/9, gây hại rộng ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Mật độ rầy phổ biến: 400-500 con/m²; nơi cao: 1.500-2.000 con/m²; ở trên 5.000 con/m². Nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời, những diện tích bị hại nặng sẽ làm đổ lúa hoặc gây cháy ở từ sau 1/9 trở đi và là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen phương Nam trên đồng ruộng.

Ngoài ra sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 sẽ nở rộ từ 22/8- 30/8, gây hại cục bộ trên các trà lúa, đặc biệt trên trà lúa mùa sớm và mùa trung diện xanh tốt, mật độ sâu phổ biến: 15-20 con/m²; nơi cao: 50-70 con/m²; cá biệt trên 100 con/m² (Yên Mô, Yên Khánh...). Quy mô, mức độ hại thấp hơn so với vụ mùa 2017; bệnh khô vằn, bệnh lùn sọc đen phương Nam tiếp tục hại tăng trên các trà lúa; bệnh bạc lá, đốm sọc hại cục bộ.

Trước tình hình sâu đục thân lúa 2 chấm lúa 5 và rầy nâu, rầy các loại có khả năng gây hại rộng ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:

- Điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối, đúng kỹ thuật tạo điều kiện cho cây khoẻ nhằm tăng khả năng chống chịu các đối tượng dịch hại và điều kiện thời tiết bất thuận.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân rõ các trà lúa, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng không được phun thuốc tràn lan (Chú ý: Sâu đục thân lúa 2 chấm, rầy nâu, rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh bạc lá do nấm vi khuẩn, bệnh khô vằn...).

*** Đối với bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa:** Tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 18 ngày 27/7/2018 về tình hình bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2018.

*** Đối với sâu đục thân lúa 2 chấm:** Phun trừ trên những ruộng có mật độ ổ trứng $\geq 0,3$ ổ/m² khi sâu non tuổi 1 nở rộ. Thời gian phun trừ từ ngày 25/8-10/9. Những ruộng có mật độ ổ trứng ≥ 1 ổ/m² phải phun kép 2 lần, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Prevathon 5SC; Voliam Targo 063SC, Tasodant 600EC; Bonus Gold 50EC; Victory 585EC; Virtako 40WG...

*** Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng:** Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ kịp thời trên những ruộng có mật độ rầy ≥ 2000 con/m², thời gian phun trừ từ 25/8 đến 30/8 bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Penaltyl 40WP, Sutin 5 EC; 50 SC, Midan 10WP, Chersieu 50 WG, Chess 50 WG ... Những ruộng có mật độ cao phải tiến hành phun trừ 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 4-5 ngày.

*** Đối với sâu cuốn lá nhỏ:** Phun trừ trên những diện tích có mật độ sâu ≥ 20 con/m² đối với trà lúa mùa sớm và ≥ 50 con/m² đối với trà lúa mùa trung, khi sâu non tuổi 2 rộ. Thời gian phun trừ từ ngày 25/8 đến 30/8 bằng các loại thuốc có hoạt chất: Fipronil, Indoxacarb, Abamectin, Emamectin. Những ruộng có mật độ sâu cao ≥ 200 con/m² phải tiến hành phun trừ 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 4-5 ngày.

Ngoài ra tiếp tục diệt trừ chuột bằng các biện pháp, theo dõi và kết hợp phun trừ bệnh khô vằn hại lúa.

Các Trạm Trồng trọt và BVTV căn cứ vào thông báo của chi cục và tình hình cụ thể, tham mưu với UBND các huyện, thành phố ra thông báo, hướng dẫn cho các HTX và bà con nông dân phun trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại gây ra. /.

Nơi nhận:

- Cục BVTV; Trung tâm BVTV phía bắc; (để b/c)
- Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình; (để b/c)
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nghiệp vụ tổng hợp – Sở NN&PTNT;
- Trung tâm khuyến nông;
- Phòng kinh tế, P. Nông nghiệp các huyện, thành phố;
- Trạm TT và BVTV các huyện, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Ninh Bình;
- Lưu VP.



Vũ Khắc Hiếu